

Numéro HER
313

Identification

Nom
η (eta)

Morphotype
B1 (Siphophage)

Autres désignations

Taxonomie

Domaine

Règne

Embranchement

Classe

Ordre

Famille
?1

Genre

Espèce

Images

Photo en microscopie électronique

Image



Description de l'image

Magnification: 297,000X

Bar: 50 nm

Staining: UA

Caractéristique

Clear plaques of 0.5mm
Buoyant density in CsCl = 1.495g/mL

Séquence génomique

Activé

Conditions de propagation

Hôtes bactériens

1311

Référence

Von Lohr, R. 1970. Z. Allg. Mikrobiol. 10:269-274. (En allemand/ In deutsch)

Pons, F.W. 1966. Biochem. Z. 346:26-40. (En allemand/ In deutsch)

Remarque

Originally described as short tailed.

Guanine partially replaced by unknown base; DNA contains nonidentified sugar.

Infects log-phase cells only.

Adsorbs well, forms large, moderately turbid plaques from which lysogens can be isolated.

Pre-adsorption is not required for plating.

Phage inoculum for double-layer agar 15 000 PFU, yield 10¹¹ PFU.

Multiplies on *S. marcescens* CV (If)

Historique

Historique

Received from

R.W. Kaplan

Date

Received from

Dr F.W. Pons

Institut fér Mikrobiologie

Johann Wolfgang Goethe-Universitat

Theodor-Stern-Kai 7, Haus 75A

D-6000 Frankfurt am Main, Germany

Date

03-03-1988

Isolated by

R.W. Kaplan

Institut fér Mikrobiologie

Frankfurt, Germany

Date

1960

Source

Supernatant of an overnight culture of a lost strain : *S. marcescens* ES

Dernière mise à jour

2024-01-19